

# 同意書

## 高濃度ビタミンC点滴

- 施術により、下記の症状が起こる場合があります。穿刺部位の腫れ・内出血、発疹、腫れ、むくみ、痒み、蕁麻疹、頭痛、筋肉痛、発熱、倦怠感、冷や汗、アナフィラキシーショック、感染症
- 高濃度ビタミンC【フル】点滴を希望される際は必ず血液検査を受けて頂きます。  
G6PDという酵素が欠損している遺伝性疾患の方が、高濃度のビタミンCを投与すると溶血することがあります。検査結果到着には1週間程度かかります。  
※既に他院でG6PD検査をされたことがある方は、G6PDの値が確認できる検査結果をお持ち頂ければ当クリニックでの採血は必要ありません。
- 実施中に緊急又は予想外の処置が必要な場合には、適宜処置をさせていただきます。  
しかし、専門的な検査・治療を要する際の移送やそこでの検査・治療等に関わる一切の費用に関して当クリニックは責任を負いません。
- 血管内に直接投与するため、美容成分が体全体に浸透します。しかし、摂取後すぐに効果が実感できるわけではありませんので継続的な治療をおすすめします。
- 注意事項
  - (1)点滴投与中の刺入部あるいは周囲の痛み、吐き気や頭痛
    - ・浸透圧や投与速度、血管の状態により痛みを感じることがあります。
    - ・投与速度で調整することで軽減することができますので、症状が強い時はお申し出下さい。
  - (2)眠気
    - ・ビタミンCの抗ヒスタミン作用によるものであり、一時的な症状ですので心配ありません。
  - (3)口渇
    - ・高濃度ビタミンCを投与すると脱水を生じることがあります。
    - ・点滴投与前に水分を十分に摂取して頂き、投与中にも適宜摂取して頂くことをおすすめします。
  - (4)その他
    - ・空腹で高濃度ビタミンCを投与すると気分が悪くなる場合があります。
    - ・喫煙はビタミンCの血中濃度が十分に上がらない原因となります。
    - ・点滴投与には【ハーフ】20分程度【フル】40分程度を要するため予めお手洗いを済ませ下さい。
    - ・20歳未満の方はご案内いたしかねます。

私は上記内容を理解し、施術に同意します。

○本人

令和      年      月      日      氏名

---